



今日为您小孩 预防乙肝， 明日远离肝癌

早期接触乙型肝炎可能导致肝癌，但这是可以预防的

乙型肝炎是一种严重的感染，随着时间的推移会损害肝脏，并导致肝硬化或肝癌。它通过直接接触受感染的血液传播，最常见的是在出生期间由母亲传给孩子。

日常防护不可掉以轻心，幼儿常因出牙、尿布疹、喂哺时牙龈受损或运动受伤而产生微小伤口。由于许多感染者（包括看护人员及其他儿童）并不知道自己携带病毒，即便肉眼看不见的微量病毒进入这些伤口，也足以导致终身感染。

即使是极少量的血液进入开放性伤口或疮口，也可能导致终身感染——即使您看不见它。



美国婴儿乙肝疫苗接种程序

(适用于 1 岁以下婴儿)

疫苗	第一剂 《出生首剂》	第二剂	第三剂	第四剂
 3 剂次系列疫苗 (品牌名称: Engerix-B, Recombivax HB)	出生后 24 小时内 	第一剂后 1 个月 	第一剂后 6 个月 	
 4 剂次联合系列疫苗 (五联或六联疫苗) 品牌名称: Vaxelis, Pediarix	出生后 24 小时内 (乙肝疫苗) 	6 周大 (联合疫苗) 	14 周大 (联合疫苗) 	6 个月大 (联合疫苗) 

图例



= 单价疫苗 (仅针对乙肝)



= 联合疫苗 (乙肝及其他多项疾病的联合防护)