

¿Cómo puedo proteger a mi hijo de la hepatitis B?



DURANTE EL EMBARAZO

- Hágase una prueba de hepatitis B durante su primer trimestre.
- Si el resultado es negativo y nunca ha recibido la vacuna, puede vacunarse para protegerse a sí misma y a su bebé.
- Si el resultado es positivo, aún puede tener un embarazo saludable mientras toma las medidas necesarias para prevenir la transmisión.



AL NACER

- La mejor protección es administrarle a su bebé la vacuna contra la hepatitis B en la sala de partos o dentro de las primeras 12 a 24 horas del nacimiento.
- Si usted vive con hepatitis B o no está segura de su estado, es posible que su bebé también necesite la inmunoglobulina contra la hepatitis B (HBIG) al nacer para ayudar a protegerlo. Su equipo de atención médica puede asegurarse de que se le administre.
- Después de la primera dosis, complete la serie de vacunación con una segunda dosis a los 1-2 meses y una tercera dosis a los 6-18 meses.



NIÑOS MAYORES

- Nunca es demasiado tarde para que su hijo reciba la vacuna contra la hepatitis B.
- Los niños de 18 años o menos que no recibieron las dosis anteriores aún deben vacunarse.
- Consulte al pediatra de su hijo sobre cómo completar la serie de vacunación.

Referencias:

1. Academia Americana de Pediatría. (2026). Cronograma de inmunización recomendado para niños y adolescentes de 18 años o menos. <https://downloads.aap.org/AAP/PDF/AAP-Immunization-Schedule.pdf>.
2. Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. (2025). Hepatitis B: La enfermedad y las vacunas. <https://www.chop.edu/vaccine-education-center/vaccine-details/hepatitis-b-vaccine>.
3. McIntosh, E. D. G., & Bek, M. D. (1997). Transmisión horizontal de la hepatitis B en una guardería infantil: un evento prevenible. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 21(7), 791-792.